



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIȚA
Str. T.Vladimirescu nr.15-19, cod 130095, Târgoviște, jud. Dâmbovița,
Tel. 0245-613604, fax 0245-611067
e- mail dspdambovita@dspdambovita.ro,
Cod operator date cu caracter personal nr.12777
Nr. 1/2400/30.05.2025

Către,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - TOATE
ÎN ATENȚIA DOAMNEI/DOMNULUI PRIMAR

Stimate doamnă/domnule Primar

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică județene supraveghează evoluția bolilor transmisibile din România și promovează măsurile specifice de prevenire a lor.

O serie de boli transmisibile, unele de gravitate extremă, sunt transmise la om prin intermediul insectelor vectoare de tipul țânțarilor și a căpușelor (meningoencefalită cu virusul West Nile, malaria, boala Lyme, encefalita de căpuse, febra Q, febra butonoasă, febrile hemoragice, etc.). Răspandirea rapidă și persistența insectelor vectoare este favorizată și de modificările de ordin climatic (temperaturi ridicate, valurile de caldură ce urmează ploilor abundente) precum și de intensificarea circulației de călători și mărfuri.

Controlul acestor boli poate fi realizat prin următoarele măsuri:

- măsuri de control a vectorilor,
- educația populației în ceea ce privește autoprotecția și cooperarea la programele prevenționale.

➤ **Măsurile de control a vectorilor:**

În conformitate cu *Ord. nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației,*

“ Consiliile locale,....., primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a Direcțiilor de Sănătate Publică teritoriale.

Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin”.

Dezinsecția periodică se face la intervale de 3 luni, iar deratizarea periodică se face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor”.

Pentru aceasta este necesar să derulați acțiuni de combatere a vectorilor, care vor viza toate locurile cunoscute a fi locuri de înmulțire a țânțarilor (parcuri, cimitire, lacuri, zone de depozitare anvelope, zone de staționare a tirurilor, precum și în jurul secțiilor de Boli Infecțioase).

Totodată este necesar să vă asigurați că substanțele chimice utilizate pentru combaterea vectorilor dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic și sunt active pe speciile de vectori vizați.

Ce trebuie să știm despre țântari?

Trăiesc sub formă de larve în: apa acumulată în subsolurile blocurilor în apa care nu se scurge din canalizarea înfundată, în bălțile care se formează în apropierea locuințelor, din apa care curge din conductele sparte și din alte instalații neîntreținute, în apa de ploaie păstrată în

butoaie/vase în curte, în apa acumulată în recipiente vechi aruncate la întâmplare în preajma locuințelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc.), în apa din gropile și șanțurile de pe șantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalații.

Sub forma adultă, zburând, mai ales dimineața devreme sau în amurg, căutând posibilitatea de a se hrăni cu sânge, intră în locuințe prin ferestrele lăsate deschise, prin casa scării, prin orificiile de aerisire unde pot rămâne peste noapte.

În timpul zilei se adăpostesc în locuințe, subsoluri, poduri, cotețe, grajduri, magazii, frunzișul copacilor.

Pentru a împiedica înmulțirea țânțarilor se recomandă:

- evacuarea apei din subsoluri;
- repararea instalațiilor de apă și canalizare din subsoluri și din apropierea locuințelor;
- renunțarea la păstrarea apei în butoaie în curte sau să le protejăm de accesul țânțarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;
- evitarea aruncării la întâmplare a obiectelor care favorizează stagnarea apei;
- îndepărtarea permanentă a gunoaielor menajere în care se adăpostesc țânțarii;

Pentru a evita mușcătura de țânțar se recomandă:

- purtați îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, dacă ieșiți seara din locuințe sau în parc la plimbare sau în pădure, la pescuit, în Delta;
- utilizați substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor (acestea sunt comercializate în farmacii sub denumiri comerciale -DEET, icaridin/ picardin, IR 3535, etc.), în concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, pe care să le aplicăm pe părțile descoperite ale corpului;
- împiedicați pătrunderea țânțarilor în casă:
 - plase de protecție la ferestre/uși;
 - utilizând substanțe insecticide în locuință/în jurul locuinței;
 - utilizând în locuință aerul condiționat;
 - utilizând plase împotriva țânțarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri menționate anterior sau dacă dormiți în aer liber.
 - acoperind pătuțul copilului sau căruciorul cu plase împotriva țânțarilor.

Ce trebuie să știm despre căpușe?

Căpușa vectoare evoluează pe mamifere mari și mici, câini, pisici, rozătoare, etc. și trece ușor de pe acestea pe sol, vegetație, etc.

Pentru a împiedica înmulțirea căpușelor se recomandă:

- combaterea rozătoarelor (depozitarea corectă a gunoiului menajer, depozitarea corectă a proviziilor – inclusiv grâne, fân, etc.), folosirea de capcane, momeli otrăvite, etc;
- descurajarea prezenței animalelor de companie și comunitare în preajma spațiilor de joacă pentru copii, în zonele de agrement, spații verzi, parcuri publice, etc.;
- aplicarea de tratamente cu acaricide adecvate asupra animalelor de companie (câini, pisici, etc) și asupra celor domestice (oi, capre, vaci, cai și păsări de curte).
- reducerea vegetației înalte (ierburi, tufișuri), tunderea gazonului sau a spațiilor înnierbate;
- înlăturarea frunzelor moarte, a crăcilor căzute și arderea acestora;
- înlăturarea vegetației din vecinătatea sau de pe pereții caselor;
- astuparea găurilor/crăpăturilor din pereții caselor.

Recomandări la aplicarea tratamentelor de combatere chimică:

- se va anunța populația cu privire la această acțiune prin mijloace mass-media, afișe, alte tipuri la îndemână, inclusiv cu posibilele reacții adverse, menționate de producător în eticheta/prospectul produsului;
- se vor respecta cu strictețe forma, concentrația și modul de utilizare a insecticidelor, stabilite la avizarea sanitară a produsului biocid, precum și măsurile de protecție a operatorilor, măsurile de prevenire a poluării mediului înconjurător și măsurile pentru prevenirea accidentelor;
- vor fi folosite doar produse biocide cuprinse în Registrului Național al Produselor Biocide prezentat pe site-ul www.ms.ro, actualizat, avizate de Comisia Națională a produselor Biocide.

➤ **Educația populației în ceea ce privește autoprotecția și cooperarea la programele prevenționale**

- dacă ieșiți seara din locuințe sau ieșiți seara în parc la plimbare sau când mergeți în pădure, la pescuit, în Deltă, purtați îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi,
- folosiți substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor și a căpușelor, comercializate în farmacii (de tipul - DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), în concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, pe care să le aplicați pe părțile descoperite ale corpului,
- împiedicați pătrunderea țânțarilor în casă prin utilizarea de plase de protecție la ferestre/uși,
- utilizați substanțe insecticide în locuinți/în jurul locuinței,
- utilizați în locuință aerul condiționat,
- utilizați plase împotriva țânțarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri menționate anterior sau dacă dormiți în aer liber,
- acoperind pătuțul copilului sau căruciorul cu plase împotriva țânțarilor,
- protejarea animalelor de companie prin aplicarea profilactică de produse insecticide și tratamentelor cu acaricide.

Ținând cont de cele menționate mai sus, vă rugăm să demarați acțiunile de combatere a atropodelor vectoare de agenți patogeni generatori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort considerând recomandarea de a utiliza metode combinate, acționând în concordanță cu stadiile de dezvoltare și locurile de adăpostire ale acestora precum și promovând măsurile de educație a populației din aria de responsabilitate.

Direcția de Sănătate Publică vă va notifica în scris toate cazurile confirmate de Infecție cu Virusul West Nile pentru a intensifica operațiunile, în aria dumneavoastră de responsabilitate.

În speranța bunei colaborări,



Medic șef DSSP,
Dr. Gabriela Corina Costea

Medic coordonator CSECBT,
Dr. Gabriela Neagu